Laboratoires ROCHEX

pH	0.0

Flacon 1 L : 140 365
Code GTIN : carton 10x1L : 3770027679097
Code douanier : 38089410

Conforme CE n° 648/2004

HYGINET sp

Gel Détartrant Désinfectant Nettoyant Désodorisant

INTERETS

- Produit 4 en 1 : détartrant, nettoyant, désinfectant, désodorisant.
- Formule gélifiée pour optimiser le temps de contact et empêcher les phénomènes de nébulisation type spray.
- Assure en une seule intervention l'hygiène et l'assainissement des cuvettes de WC et locaux sanitaires.

CARACTERISTIQUES

- A base d'un mélange d'acides organiques forts.
- Evite les opérations de remise en état.
- S'utilise en entretien ou en rénovation pour l'élimination des dépôts calcaires.

DESTINATION

- Domaine médical, collectivités, institutions, espaces publics
- Cuvette des toilettes, sanitaires
- Pour les surfaces hors contact alimentaire (TP2).

FORMULATION ET APPLICATION

- Formulation sans phosphate
- Formulation bactéricide, lévuricide, fongicide et virucide (sur virus enveloppés).
- Substance active biocide: Chlorure de benzalkonium [68424-85-1] : 1,34 %p/p, TP2.

UTILISATION

- Gel Prêt à l'emploi
- Temps de contact : 5 à 15 minutes selon le spectre de désinfection et le détartrage souhaité
- Fréquence : une fois par jour
- Manuelle : verser le gel sur le pourtour de la cuvette intérieur des toilettes, brosser si nécessaire après le temps de contact
- Conserver à une température entre 0 et 35°C
- Ne pas utiliser sur pierres calcaires ou naturelles, sur aluminiums.

B.P. 263 – 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.fr

Laboratoires ROCHEX

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13727	*Pseudomonas aeruginosa* *Enterococcus hirae* *Staphylococcus aureus* *Escherichia coli*	**20°C / 5 min**	**Pur**
EN 17387 **Sans action mécanique**	*Pseudomonas aeruginosa* *Enterococcus hirae* *Staphylococcus aureus* *Escherichia coli*	**20°C / 5 min**	**Pur**
EN 16615 **Avec action mécanique**	*Pseudomonas aeruginosa* *Enterococcus hirae* *Staphylococcus aureus*	**20°C / 5 min**	**Pur**
LEVURICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13624	*Candida albicans*	**20°C / 5 min**	**Pur**
EN 17387 **Sans action mécanique**	*Candida albicans*	**20°C / 5 min**	**Pur**
EN 16615 **Avec action mécanique**	*Candida albicans*	**20°C / 5 min**	**Pur**
FONGICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13624	*Aspergillus brasiliensis*	**20°C / 15 min**	**Pur**
EN 17387	*Aspergillus brasiliensis*	**20°C / 15 min**	**Pur**
VIRUCIDIE sur VIRUS ENVELOPES – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 14476	*Vaccinia virus*	**20°C / 5 min**	**Pur**
EN 16777	*Vaccinia virus*	**20°C / 5 min**	**Pur**

***Conditions de saleté du domaine médical : 3 g/L BSA + 3 mL/L Erythrocytes de mouton.**
En conformité avec le Règlement (UE) n° 528/2012, les normes du domaine médical couvrent les normes du domaine collectivités/institutions/espaces publics (conditions de saleté 3g/L BSA) :

- **EN13727 couvre EN1276**
- **EN13624 couvre EN1650**
- **EN17387 couvre EN13697**

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.