



|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                                                                      | 11.7                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|                      |  |  |  |
|  CONTACT ALIMENTAIRE |                                                                                     | Conforme à l'arrêté du<br>19.12.2013                                                |                                                                                     |

**Laboratoires  
ROCHEX**

Conforme CE n° 648/2004

# HYGIROC nv

## Dégraissant Désinfectant Spécial Alimentaire

### INTERETS

- ☐ Large spectre d'action en désinfection en présence de conditions de saleté (salissures) et à basses températures (10°C)
- ☐ Pouvoir dégraissant et pouvoir moussant adaptés pour le nettoyage de surfaces alimentaires

### CARACTERISTIQUES

- ☐ Efficacité optimale sur salissures grasses et organiques (sang, huiles...).
- ☐ Pas de contrainte quant à un environnement isotherme et/ou frigorifique.

### DESTINATION

Industries agroalimentaires, cuisines, cantines, restauration hors foyers.  
Pour toutes les surfaces en domaine alimentaire (TP4/TP2) : sols, murs, plans de travail, gros matériel, locaux et ateliers de stockage, véhicules de transport alimentaire...

### FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Formulation équilibrée : sel d'ammonium quaternaire, tensioactif non ionique, base forte, séquestrant.
- ☐ Formulation concentrée bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
- ☐ Substances actives biocides : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium [7173-51-5] : 3.5% p/p en substance active pure et 3.85% p/p en substance active technique, TP4/ TP2

### UTILISATION

- ☐ Manuelle ou mécanique : mono brosse, auto-laveuse, nettoyeur haute pression, canon à mousse, centrale d'hygiène.
- ☐ Rincer après application.
- ☐ Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- ☐ L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Eviter le rejet dans l'environnement.
- ☐ FDS sur demande

**\* Formule Sans Phosphate** : Le phosphore est un élément chimique fondamental de l'ADN de tous les organismes vivants. Ressource non renouvelable et très consommée, il est important d'en modérer son utilisation. Le rejet de phosphates entraîne une hyperfertilisation des algues, qui sont à l'origine de l'eutrophisation des rivières, néfaste pour la biodiversité.



# HYGIROC NV

## DOSAGE

☐ A partir de 1.5 %

## TEMPS DE CONTACT

☐ 5 à 30 mn selon le spectre de désinfection souhaité

## REFERENCES

☐ Bidon 5 L : 130 225

☐ Code douanier : 38089410

| NORMES                                        | SOUCHES TESTEES                                                                                                                                                                             | CONDITIONS D'ESSAI                                                 | CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                |
| EN 1276                                       | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Escherichia coli</i><br><i>Enterococcus hirae</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br><br><i>Salmonelle Typhimurium</i><br><i>Listeria monocytogenes</i> | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min                                      | 2%<br>1%                       |
| EN 13697<br>Sans action mécanique             | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Escherichia coli</i><br><i>Enterococcus hirae</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br><br><i>Salmonelle Typhimurium</i><br><i>Listeria monocytogenes</i> | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min<br><br>20°C - 5 min<br>20°C - 15 min | 2.5%<br>1.5%<br><br>3%<br>1.5% |
| EN 16615<br>Avec action mécanique             | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Escherichia coli</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br><br><i>Salmonelle Typhimurium</i><br><i>Listeria monocytogenes</i>                              | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min                                      | 1.5%<br>1%                     |
| <b>LEVURICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*</b>  |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                |
| EN 1650                                       | <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                     | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min                                      | 2%<br>1%                       |
| EN 13697<br>Sans action mécanique             | <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                     | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min                                      | 3%<br>1.5%                     |
| EN 16615<br>Avec action mécanique             | <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                     | 20°C - 5 min<br>20°C - 15 min                                      | 2%<br>1.5%                     |
| <b>FONGICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE*</b>  |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                |
| EN 1650                                       | <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                                                             | 20°C / 15 min                                                      | 4%                             |
| EN 13697<br>Sans action mécanique             | <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                                                             | 20°C / 15 min                                                      | 5%                             |
| <b>VIRUCIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE*</b>   |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                |
| EN 14476                                      | <i>Poliovirus</i>                                                                                                                                                                           | 20°C / 15 min                                                      | 4.5%                           |
| EN 14476/EN16777<br>Virus nus                 | <i>Adenovirus</i><br><i>Norovirus</i><br><i>Rotavirus</i>                                                                                                                                   | 20°C / 15 min                                                      | 3.5%                           |
| EN 14476/EN16777<br>Virus enveloppés          | <i>MVA</i><br><i>Coronavirus</i>                                                                                                                                                            | 20°C / 15 min                                                      | 3.5%                           |

\*Conditions de saleté : 3 g/L BSA

Pour un usage en ABATTOIRS ET BOUCHERIES : Le produit est efficace à 10°C en conditions de saleté 3 g/L BSA + 3mL/L EM : Bactéricide, Levuricide: 5% en 5 minutes et fongicide à 5% en 30 minutes.

B.P. 263 – 74106 ANNEMASSE  
Cedex France  
Tél : 04 50 37 49 54

[www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr)

Laboratoires  
**ROCHEX**